

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ฉบับวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566

ระยะข้าวนาปีแตกกอ เผ่าระวังแมลงดำหนาม



“ช่วงระยะข้าวนาปีเริ่มแตกกอในปีที่ผ่านมา พบการระบาดของแมลงดำหนามเข้าทำลายนาข้าวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในช่วงนี้ให้เผ่าระวังแมลงดำหนามอย่างต่อเนื่อง ให้หมั่นสำรวจแปลงนา และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอยู่เสมอ ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยหรือหลบซ่อนของแมลงดำหนาม ตลอดจนใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช อันจะส่งเสริมให้ต้นข้าวมีความแข็งแรง ทำให้ศัตรูเข้าทำลายได้ยากขึ้น”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแมลงดำหนาม...เป็นแมลงศัตรูข้าวที่มักจะกัดกินเนื้อเยื่อส่วนสีเขียวบริเวณใบข้าวทั้งที่เป็นระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย มีวงจรชีวิตรวม 1-2 เดือน โดยตัวหนอนจะซ่อนใบจนเห็นเป็นรอยแผ่นขุ่นขาวขนานกับเส้นทางใบ ตัวเต็มวัยจะแทะผิวใบเป็นรอยชุดขาวขนานตามทางใบคล้ายคลึงกัน ทำให้ใบข้าวเสียหาย หากถูกทำลายรุนแรงเป็นจำนวนมาก ใบข้าวจะแห้งเป็นสีน้ำตาล

เหมือนรอยไฟไหม้ ทำให้ผลผลิตลดลง

วิธีการสังเกต ให้สำรวจบริเวณกอข้าว แมลงดำหนามข้าวตัวเต็มวัยจะมีปีกแข็งสีดำและมีหนามแข็งแหลมปกคลุมลำตัว ความยาวประมาณ 5-6 มิลลิ เมตร ตัวเมียชอบวางไข่บริเวณปลายใบข้าวอ่อน ตัวเต็มวัยนี้จะมีอายุประมาณ 14-21 วัน วางไข่ได้ ประมาณ 50 ฟอง ส่วนตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่แล้วมี ลำตัวแบนสีขาว สามารถกัดกินเนื้อเยื่อภายในผิวใบข้าวสร้างความเสียหายต่อไปได้



ส่วนวิธีป้องกันและกำจัด อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำว่า นอกจากเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาข้าวอย่างสม่ำเสมอในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดจนไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป และกำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนาและคันนาแล้ว เกษตรกรยังควรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอนด้วย เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชในวงกว้าง หากสำรวจพบตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามข้าวมากกว่า 2 ตัวต่อกอหรือกลุ่มต้นข้าว ควรใช้สารกำจัดฉีดพ่น เช่น พิโปรนิล หรือ คลอไทอะนินดิน ในอัตราตามที่ฉลากแนะนำ และให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อขอคำแนะนำในการควบคุมการระบาด สกัดกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น

