

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

## ฉบับวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

### เดือนเฝ้าระวังหนอนเจาะผลส้มโอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนส้มโอช่วงแดดแรง กลางวันลมแรง และกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้เฝ้าระวังหนอนเจาะผลส้มโอในระยะที่ต้นส้มโอติดผล เริ่มแรกจะพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็น กลุ่มประมาณ 2-29 ฟอง บนผลส้มโออายุ ประมาณ 2 สัปดาห์ จนถึงระยะเก็บเกี่ยว เมื่อหนอนฟักตัวจะกัดกินเข้าไปในผลส้มโอ โดยรอยเจาะทำลาย ของหนอนจะมีมูลถ่ายออกมา และมียางไหลเยิ้ม ทำให้ผลเน่าและร่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอ โดย แนวทางป้องกันแก้ไขการเข้าทำลายของหนอนเจาะผลส้มโอ เกษตรกรควรควบคุมบังคับให้ต้นส้มโอแตก ยอด ออกดอก และติดผลในระยะเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการป้องกันกำจัด สะดวกในการดูแลรักษา และช่วยลดปริมาณหนอนเจาะผลส้มโอ จากนั้นให้เกษตรกรเก็บหรือเด็ดผลอ่อนที่ถูกหนอนเจาะผลส้มโอเข้าทำลาย นำไปฝังหรือเผาทิ้งนอกแปลงปลูก ป้องกันไม่ให้ระบาดต่อไป

สำหรับในแหล่งปลูกที่พบการระบาดเป็นประจำ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจตรวจดูหนอนเจาะผลส้มโอในแปลงปลูกช่วงที่ต้นส้มโอติดผลอ่อน เมื่อผลส้มโออายุประมาณ 2 สัปดาห์ เกษตรกรควรพ่นด้วยสาร มาแมลงอิมามาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไพโรฟิโนฟอส 50% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไพโรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่น 4 ครั้ง และพ่นห่างกัน ทุก 7 วันจากนั้นเมื่อผลส้มโออายุประมาณ 1.5 เดือน เกษตรกรควรห่อผลด้วยถุงกระดาษห่อผลสีขาว ป้องกันการเข้าทำลายของหนอนเจาะผลส้มโอ

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

## ฉบับวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

### คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน : ยางใบร่วงส่อลามทั่วประเทศ



สถานการณ์ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราพื้นที่ จ.นราธิวาส กำลังคืบคลานมาซ้ำเติมชาวสวนยาง แม้จะทราบกันว่า ตัวการสำคัญ คือ เชื้อรา *Pestalotiopsis* spp. ที่ถูกลมพัดหอบมาจากประเทศเพื่อนบ้าน...แต่ยังไม่แน่ชัดในเรื่องของวิธีการรักษา

เบื้องต้นมีการสันนิษฐาน สารเคมีกำจัดเชื้อราอย่าง hexaconazole, benomyl และ thiophanate methyl น่าจะเอาอยู่ แต่กระนั้นทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการรอผลการทดสอบนำโดรนบรรจุสารฉีดพ่นใน ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

สำหรับความคืบหน้าของการระบาด ประหยัด ลอแม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ระบุว่าขณะนี้โรคยางใบร่วงระบาดหนักแทบจะทุกอำเภอ ที่สำคัญตอนนี้มีรายงานว่า โรคนี้ได้ระบาดไปถึง จ.ตรังแล้ว ซึ่งทางสภาเกษตรกรฯ และ กยท.กำลังติดตามสถานการณ์อยู่ และที่ร้ายไปกว่านั้น หากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ ปล่อยให้ลามใน จ.นราธิวาสได้ 90% ของพื้นที่มีโอกาสอย่างยิ่งที่โรคจะลามไปสู่จังหวัดอื่นๆของภาคใต้ และกระจายไปในพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กยท. กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งหาวิธีรับมือแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา ทั้งในส่วนของสารเคมี ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ เบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร ห้ามเคลื่อนย้ายวัสดุปลูก ใบ กิ่งตา สู่พื้นที่อื่น พร้อมกับให้สังเกตใบยาง หากใบที่ร่วงมีลักษณะวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ให้เปลี่ยนเป็นกรีดยางวันเว้นวัน แล้วใส่ปุ๋ยบำรุงต้นให้แข็งแรง หากพบอาการใบร่วงหนักให้หยุดกรีด เพราะต้นยางที่อ่อนแออยู่แล้วอาจตายได้

สะ-เล-เต