

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : โรคใบจุด...เบญจมาศ



ระยะนี้ฝนตกชุกความชื้นสูงเอื้อให้เชื้อราเจริญเติบโตและแพร่ได้รวดเร็ว กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกเบญจมาศเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบจุด ที่เกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต

อาการเริ่มแรกจะอยู่ที่ใบส่วนล่างใกล้ดิน เกิดจุดสีน้ำตาลขนาดเล็ก ขอบแผลมีสีเหลือง เมื่อขนาดของแผลขยายใหญ่ขึ้น กลางแผลจะมีจุดสีเทาดำขึ้นอยู่

กระจัดกระจาย นี้แหละสปอร์เชื้อรา ตัวการที่ทำให้เกิดการระบาด จากนั้นโรคจะค่อยๆลุกลามขึ้นไปส่วนบน และแสดงอาการเน่าไปสู่อยอด เมื่อแผลลุกลามมากใบจะเน่าแห้งทั้งใบและหักพับติดอยู่กับลำต้น หากระบาดรุนแรงแผลจะลามขยายติดกัน ทำให้ใบไหม้ ร่วงหล่น และลุกลามถึงใบยอดจนใบไหม้ทั้งต้น ให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคให้ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บใบเป็นโรคที่ร่วงหล่นไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก แผลงที่เกิดโรครระบาด งดการให้น้ำแบบพ่นฝอย ควรเปลี่ยนมาให้ให้น้ำในระบบน้ำหยดแทน เพราะสปอร์เชื้อราสามารถแพร่ระบาดไปตามลม และติดไปกับเศษซากจากพืชที่เป็นโรคร่วงหล่นสะสมอยู่ในดิน รวมทั้งแพร่ไปได้ดีกับน้ำ ติดไปกับการสัมผัสของแมลงและเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร หากกำจัดไปแล้วโรครยังคงระบาดอยู่อีก ให้พ่นด้วย ไดฟิโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอโรทาโลนิล 50% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน

หลังจากหมดฤดูปลูกแล้ว เกษตรกรควรทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกโดยเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก จากนั้นตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก การปลูกในฤดูถัดไปให้ใช้กิ่งพันธุ์ที่ปลอดโรค ควรปลูกให้มีระยะปลูกที่เหมาะสม หลีกเลี้ยงปลูกต้นเบญจมาศชิดกันเกินไป เพื่อลดการระบาด...ส่วนพื้นที่เกิดโรครระบาด ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนแทน

สะ-เล-เต