

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : มันสำปะหลังระวัง...ไรแดง



เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง กรมวิชาการเกษตรเตือนชาวไร่มันสำปะหลัง... อย่าทีกักเข้าใจผิด เดียวจะสูญเงินเปล่าๆ เห็นต้นใบมันสำปะหลังเหลืองแห้งเหี่ยว คิดไปเองว่าเจอเพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟเล่นงาน ไปซื้อยาฉีดมาฉีดพ่น อาการไม่ดีขึ้น...ก่อนจะไปหาซื้อสารมากำจัด เดินเข้าไปดูใกล้ๆ ให้ชัด จะเห็นสัตว์ตัวเล็กจิ๋วเท่าปลายเข็มสีแดงเป็นกลุ่มเต็มไปหมด ดูด้วยตาแบบนี้จะยากหน่อยเพราะตัวมันเล็กจริงๆ แต่ถ้าสังเกตแบบง่ายๆ ตรงก้านใบมันสำปะหลังจะมีหยากไย่คล้ายแมงมุมชักใย ในหยากไย่จะมีอะไรสีแดงๆเต็มไปหมด

นี่แหละ ไรแดงเหมือน ศัตรูตัวฉกาจของมันสำปะหลังในทุกๆระยะการเติบโตโดยเฉพาะในฤดูแล้ง มาดูकिनน้ำเลี้ยงใต้ใบแก่และใบเพสลาด เกิดเป็นจุดประ-ต่างเหลืองบนผิวด้านบนใบ

หากระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปดูकिनน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อน สร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น ทำให้ใบไหม้ ตรงกลางใบขาดพรุน ใบร่วง และเหี่ยวแห้ง ถ้าพบระบาดของไรแดงเหมือน ให้เก็บใบมันสำปะหลังและส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก พื้นที่ที่มีการระบาดของรุนแรง ให้เกษตรกรฉีดพ่นด้วยสารกำจัดไรเป็นการเฉพาะ...อย่าได้ไปซื้อสารกำจัดแมลง หรือเพลี้ยมาใช้เด็ดขาด จะเปลืองทั้งค่ายาและค่าจ้าง เพราะฉีดไปไม่ได้ผล สารกำจัดไรมีให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ ไพริดาเบน 20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฟนบูทาทิน ออกไซด์ 55% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซีเฟน 24% เอสซี อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เตตระไดฟอน 7.25% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร แต่มีข้อห้าม ไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ควรพ่นสลับชนิดสารเพื่อป้องกันไรแดงตั๋อยา

ละ-ละ-เต