

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ลำไยเตรียมรับมือโรคง่ามะหยี่



กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรชาวสวนลำไยเฝ้าระวัง...โรคง่ามะหยี่ลำไยมักระบาดในระยะลำไยแตกใบอ่อน ออกดอก และผลอ่อน การเข้าทำลายช่อใบอ่อนทำให้ใบอ่อนมีขนาดเล็กลง ขอบใบบิดม้วนงอ บางครั้งใบบิดเป็นเกลียว เมื่อนำใบมาตรวจสอบด้วยกล้องที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 40 เท่าขึ้นไป จะพบเส้นขนละเอียดสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อนขึ้นปกคลุมผิวใบบนใบและใต้ใบ...สังเกตบริเวณซอกขนจะพบไรตัวเล็กคล้ายหนอน ลำตัวสีขาวนวลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ช่อใบที่ถูกทำลายจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้งคาช่อ ส่วนที่ยังไม่ถูกไรทำลายสามารถแทงช่อใบขึ้นมาใหม่แต่จะมีอาการหงิกงอ ช่อใบที่ถูกทำลายจะมีก้านช่อแตกเป็นพุ่มกระจุก มีข้อปล้องสั้นคล้ายพุ่มไม้กวาด ถ้าเข้าทำลายในระยะแตกช่อดอกจะทำให้ช่อดอกแตกพุ่มคล้ายไม้กวาด ช่อดอกสั้น ที่ดอกมีขนละเอียดสีน้ำตาลปกคลุม ดอกจะแห้งและร่วงจนเหลือแต่ก้าน ช่อเป็นพุ่มสีน้ำตาลแห้ง ไม่ติดผลหรือติดผลน้อย

ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจส่องดูโรคง่ามะหยี่ลำไยในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาดให้ตัดแต่งกิ่งและยอดที่ถูกไรทำลายนำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูกเพื่อลดการระบาด กรณีระบาดรุนแรงจนไม่สามารถตัดแต่งกิ่งที่ถูกทำลายลงได้หมด ให้ตัดแต่งทรงพุ่มต้นลำไย จากนั้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยแล้วให้พ่นด้วยสารฆ่าไร โพรพาไกต์ 30% ดับเบิลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ก่ามะถันผง 80% ดับเบิลยูพี อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และให้พ่นซ้ำเมื่อต้นลำไยแทงยอดใหม่ แต่ให้หลีกเลี่ยงการพ่นในช่วงที่มีแดดจัด จะทำให้ใบอ่อนไหม้ได้

ส่วนการปลูกต้นลำไยใหม่ให้เลือกพันธุ์ต้านทานโรค...จากการสำรวจพบว่าโรคง่ามะหยี่ลำไยจะระบาดมากในพันธุ์เขียวเขียวที่มีอายุมาก ส่วนพันธุ์อีดอและพันธุ์อื่นๆจะพบน้อยกว่า