

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561

คอลัมน์ บุคคลในข่าว : ข้าว...ชาวนาไทย



ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย
ฯ รับมอบเงิน 2 แสนบาทจาก มร.โยชิฮิโระ ทามูระ
ประธานท.บห.บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ และ นายกอง
เอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช ที่ปรึกษาอาวุโส เพื่อ
สนับสนุน “โครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่
รอดของข้าวไทย” ที่มูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ฝนมา...กะหล่ำผักกาดเน่า

ฤดูร้อนฝนยังเทกระหน่ำไม่หยุดหย่อน กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้ว กรม
วิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด อาทิ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี คะน้า
ผักกาดขาว ผักกาดหอม และกวางตุ้ง ให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคเน่าและ สามารถพบได้ในทุกระยะการ
เจริญเติบโต เป็นโรคพบการระบาดมาในช่วงฤดูฝน เกิดจากแบคทีเรียเข้าทำลายทุกส่วนของพืชทั้งในสภาพไร่และ
ในโรงเก็บ

อาการเริ่มแรกของโรคมักจะพบบนใบหรือบริเวณลำต้นมีแผลเป็นจุดฉ่ำน้ำเล็กๆ ต่อมาแผลจะขยาย
ลุกลามเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลไหม้ เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบตัวลง และมีเมือกกลิ่นเหม็นฉุนเยิ้มออกมา
จากนั้นต้นพืชจะเน่ายุบตายไปทั้งต้น

แนวทางในการป้องกันและแก้ไข...หากเริ่มพบอาการของโรคในแปลงปลูก ให้เกษตรกรรีบขุดต้นพืชที่เป็น
โรค และเก็บเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที และหลีกเลี่ยงการทำให้
ส่วนต่างๆของพืชเกิดแผล เพราะจะเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุของโรคเข้าทำลายพืชได้ง่าย ควรล้างทำความสะอาด
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรต่างๆที่นำไปใช้กับต้นที่เป็นโรค ให้สะอาดและผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้
งานทุกครั้ง

หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ควรไถกลบเศษพืชผักที่ขึ้นที่ ก่อนการปลูกพืช ควรไถพรวนพลิกหน้า
ดินให้ลึกจากผิวดินเกินกว่า 20 ซม. ทิ้งตากแดดไว้นานกว่า 2 สัปดาห์ และไถกลบพลิกหน้าดินอีกครั้ง สำหรับ
พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรค ให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน อาทิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพด เป็น
ต้น ส่วนในฤดูปลูกถัดไป เกษตรกรควรเลือกพื้นที่ปลูกที่มีการระบายน้ำที่ดี และเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของ
โรคนี้อีก