

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

## ฉบับวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562

### คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : มั่นสำปะหลังระวังไรแดง



กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูก มั่นสำปะหลังเฝ้าระวังการระบาดของไรแดง ที่ สามารถพบได้ในระยะที่มั่นสำปะหลังมีอายุ ประมาณ 3 เดือน

ไรเป็นสัตว์ตัวเล็กจิ๋วสีแดง ถ้าเป็นตัว เดี่ยวๆ มองด้วยตาเปล่าแทบมองไม่เห็น เพราะมี ขนาดเท่าปลายเข็ม แต่ด้วยมีนิสัยรวมกันอยู่เป็น

กลุ่ม เลยพอจะมองเห็นสีแดงเต็มพริ้วไปบนใบมั่นสำปะหลัง เพื่อดูตักินน้ำเลี้ยง

ไรแดงที่ทำลายมั่นสำปะหลัง มี 3 ชนิด...ไรแดงหม่อน ไรแดงมั่นสำปะหลัง และไรแมงมุมคันชวา

ไรแดงหม่อน... จะดูตักินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบแก่และใบเพสลาด หากระบาดรุนแรง ตัวไรจะเคลื่อนย้าย ไปดูตักินน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อน โดยสร้างเส้นใยปกคลุมใบและลำต้น เมื่อไรเริ่มทำลายจะสังเกตเห็นรอย ทำลายเป็นจุดประต่างเหลืองบนผิวด้านบน หากทำลายรุนแรง จะทำให้ใบไหม้ ตรงกลางใบขาดพรุน ใบลู่ลง และเหี่ยวแห้ง

ไรแดงมั่นสำปะหลัง...จะดูตักินน้ำเลี้ยงบริเวณหน้าใบ ไม่สร้างเส้นใย ใบเป็นจุดประสีชาวซีด

ไรแมงมุมคันชวา...ดูตักินน้ำเลี้ยงใต้ใบ สร้างเส้นใยปกคลุมผิวใบบริเวณที่ไรอาศัยอยู่ หากระบาด รุนแรง ทำให้ใบไหม้ ใบขาดเป็นรูบริเวณใกล้เส้นกลางใบ ส่งผลทำให้ใบไหม้ทั้งแปลง ใบร่วง และแห้งตาย

เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกมั่นสำปะหลังในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ถ้าพบการระบาดของ ไรแดง ให้เกษตรกรเก็บใบมั่นสำปะหลังและส่วนที่ถูกทำลายนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก

สำหรับในพื้นที่ที่มีการระบาดของไรแดงอย่างรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันกำจัด ได้แก่ ไพริดาเบน 20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน 24% เอสซี อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นสลับชนิดสารเพื่อป้องกันไรดี้อยา...ไม่ควรพ่นสารชนิด เดียวกันติดต่อกัน 3 ครั้ง