

## เพลี้ยกระโดดตลามถึงอีสาน แนะใช้'กับดักกาวสีเหลือง'

พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ และสกลนคร เสียหายแล้ว 6 หมื่นไร่ แนะนำเกษตรกรใช้กับดักกาวเหลือง กำจัดแทนสารเคมี

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากการสำรวจและติดตามสถานการณ์ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยความร่วมมือของกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร ล่าสุดได้รับรายงาน ว่า มีการระบาดเป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ และสกลนคร กินพื้นที่กว่า 6 หมื่นไร่ ทำให้ต้นข้าวที่อยู่ในระยะแตกกออายุ 40-60 วัน และอายุมากกว่า 60 วัน มีอาการไหม้ ต้นเหลืองเป็นหย่อมๆ และได้รับความเสียหายทางหน่วยงานในสังกัดของกรมการข้าวที่อยู่ในภูมิภาค ทั้งศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และข้าวจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และให้คำแนะนำเกษตรกรที่ได้รับความ

เดือดร้อน พร้อมทั้งสนับสนุนสารเคมีฆ่าแมลง และแนะนำวิธีการใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งจัดหน่วยบริการตรวจสอบสภาพข้าว (Mobile Unit) ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วย

“ปัญหาของเพลี้ยกระโดดทางกรมการข้าวใครขอให้ชาวนาในภาคอีสานหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน โดยให้ตรวจนับความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หากพบมีตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลวัยที่ 1-2 จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารฆ่าแมลงไพเมโททรินในอัตราตามที่ฉลากแนะนำ และงดใช้สารเคมีอบาเมกตินและไซเปอร์เมทรินในนาข้าว ซึ่งมาศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ส่วนกรณีที่แปลงนาถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในลักษณะใหม่เกิน 20% ไม่ควรใช้สารเคมีฆ่าแมลง เนื่องจากทำให้เกิดการอพยพไปยังแปลงอื่นและควบคุมการระบาดได้ยากขึ้น แต่แนะนำให้ติดตั้งกับดักกาวเหลืองเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยแทนการใช้เครื่องดูดแมลง” นายชาญพิทยา กล่าว