



โรคไหม้ระบาด...เหนือ-อีสาน

ข้อมูลล่าสุดสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์ สกลนคร และอุบลราชธานี

โดยเฉพาะในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวอย่างหนาแน่น ในเขตนาฝั่ง...สาเหตุของโรคไหม้มีมาจากเชื้อรา ที่มีจะเกิดกับต้นข้าวมีการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่แห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน ยิ่งในพื้นที่ที่มีลมพัดแรง เชื้อราจะถูกลมพัดให้เชื้อแพร่กระจายไปยังแปลงนาใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ลักษณะอาการของโรคไหม้มี 3 สังกัดได้จากใบข้าวจะมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปดวงตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผลและสามารถขยาย



ลุกลามไปทั่วใบคล้ายถูกไฟไหม้ ทำให้ต้นข้าวตาย เมล็ดลีบเสียหายในที่สุด

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายจากการระบาดของโรคไหม้ นางปาริชาติ ศรีวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว แจ้งเตือนมายังพี่น้องชาวนาในพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้

1. หากพบแผลโรคไหม้ 5% ของพื้นที่ใบข้าว ควรฉีดสารป้องกัน

กำจัดเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล อีดีเฟนฟอส คาซูกาไมซิน ไอโซโทโรไทโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุในฉลาก

2. ลดการใส่ปุ๋ยสูตรในโตรเจนสูงเช่น ปุ๋ยยูเรียเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดรุนแรงขึ้น

3. เกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคนี้ ในฤดูการปลูกข้าวต่อไป ให้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยตามอัตราที่แนะนำ หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน

และให้นำเมล็ดพันธุ์ไปคลุมด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกาไมซิน คาร์เบนดาซิม โพรคลอราซ เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การป้องกันการระบาดของโรคข้าวและแมลงศัตรูพืชได้ผลดียิ่งขึ้นในช่วงนี้เกษตรกรควรเพิ่มความถี่ในการสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที...มิเช่นนั้นจะไม่เหลือข้าวไว้ให้เก็บเกี่ยว.

ชมชื่น ชูช้อ