

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

## ฉบับวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าเหย้งดิน : สแคบบุกสวนองุ่น



อีกโรคจากเชื้อราที่มักมาในหน้าฝน กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของ...โรคสแคบ หรือโรคใบจุด ที่ชาวบ้านมักเรียกว่า โรคอีบุบ พบการระบาดในทุกพื้นที่ที่มีการปลูกองุ่น และมักมีการระบาดรุนแรงในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและมีฝนตก หรือมีน้ำค้าง

อาการของโรคมักจะเกิดขึ้นในระยะที่องุ่นแตกใบอ่อนและเริ่มติดผลอ่อน โดยจะแสดงอาการบนใบและกิ่งก้าน...อาการบนใบอ่อนเป็นจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อนขอบแผลสีเข้ม เกิดกระจัดกระจายบนใบทำให้ใบอ่อนหงิกงอ เนื่องจากการเจริญของผิวใบไม่สม่ำเสมอ ใบที่แก่มีกแตกกลางจุด ทำให้เนื้อเยื่อที่แห้งฉีกขาด ทำให้เห็นบริเวณกลางจุดเป็นรูพรุน

อาการบนเถา กิ่ง ก้าน และมือเกาะ เริ่มแรกเป็นจุดแผลสีน้ำตาล กรณีระบาดรุนแรงแผลขยายตัวขนาดใหญ่ติดต่อกัน แผลกลมสีน้ำตาล ค่อนข้างแห้ง ขอบแผลนูนแข็ง หากเกิดโรคบนกิ่งบริเวณส่วนยอดจะทำให้ยอดบิดเบี้ยว

อาการที่ผล เกิดแผลจุดสีดำยุบตัวลง ขอบแผลนูนขึ้นเห็นได้ชัดเจน หากอาการรุนแรงแผลจะขยายใหญ่ติดต่อกัน ขอบแผลมีสีอ่อนกว่าตรงกลางแผล และแผลค่อนข้างแห้ง

หากพบการระบาดในช่วงแตกใบอ่อน ให้เกษตรกรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าให้มีใบแน่นที่บจนเกินไป อีกทั้งควรตัดและเก็บส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก จากนั้นให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไดฟีโนโคลนาโซล 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพราโคลสโตรบิน 25% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอโรทาโลนิล 75% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

สช-เส-เต