

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559

ระวังไรแดงแอฟริกัน



ฝนห่างหายเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัว ในภาวะอากาศเช่นนี้ กรมวิชาการเกษตร ฝ่ายเดือนเกษตรกร ชาวสวนทุเรียนให้เฝ้าระวังการระบาดของ...ไรแดงแอฟริกัน เพราะนับแต่ปีที่แล้ว (ธันวาคม-มกราคม) จะเป็นฤดูกาลบรรยายกาศเหมาะสมให้ไรแดงแอฟริกันระบาดมากที่สุดประจำปี อีกช่วงที่มีระบบรองลงมาคือ มีนาคม-เมษายน แต่เมื่อฝนมามันจะห่างหายไป พฤติกรรมการทำลายทุเรียนของไรแดงแอฟริกัน จะเข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงใบในระยะต้นทุเรียนกำลังเตรียมตัวออกดอก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณด้านบนใบทุเรียนแก่ ทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและเหลืองซีด เนื่องจากใบทุเรียนสูญเสียคลอโรฟิลล์... แต่บางครั้งตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่บนใบเพสลาด ทำให้ใบมีอาการเหลืองซีด ไม่เขียว และไม่มันวาวเหมือนใบปกติ หากระบาดรุนแรงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้ใบทุเรียนหลุดร่วงอย่างรวดเร็ว ต้นทุเรียนจะชะงักการเจริญเติบโต และมีผลต่อการติดดอกและผลของทุเรียน

เกษตรกรสามารถสังเกตอาการได้จากการตรวจดูใบทุเรียน จะมีจุดประสีขาวกระจายทั่วใบด้านบน ต่อมากดประสีขาวจะแผ่ขยายออกไปเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้ใบดูขาวซีด เพราะมีคราบสีขาวเกาะติดเป็นผงขาวๆคล้ายฝุ่นบนใบทุเรียน และจะเห็นไรแดงแอฟริกันได้ด้วยตาเปล่า...เป็นจุดเล็กๆสีน้ำตาล วิ่งเคลื่อนไหวไปมา หากตรวจพบใบทุเรียนมีไรแดงแอฟริกัน 5 ตัวต่อใบ และใบแก่ ถูกทำลายไปมากกว่า 25% ต่อต้น ให้น้ำพ่นด้วย “สารฆ่าไร”...สารโพพราร์ไก๊ต 30% ดับเบลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารอะมิทรัฟ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และควรพ่นสารสลับชนิดกันเพื่อบังกันไรแดงดีอย่า อย่าไปหลงผิดเห็นใบทุเรียนซีด ร่วงหล่น นึกว่าเป็นโรคราくな่าโคนเน่า แล้วซื้อยามาใช้ผิดประเภท จะเสียเงินไปฟรีๆ ไม่มีประโยชน์ใดๆ

ปลูกแตงโมไร้เมล็ด..ในกระถาง



เจ้าของเกษตรแก้วฟาร์ม อ.เสลงามิ จ.ร้อยเอ็ด คิดเปลกปลูกแตงโมในกระถางได้ผลผลิตไม่แพ้ปลูกกลางแจ้ง กลายเป็นสูตรสำเร็จให้กับคนที่อยากร่ำแตงโม แต่มีพื้นที่น้อยได้นำไปใช้กัน

“เริ่มแรกปลูกเมล่อนในโรงเรือน พร้อมกับไปรับแตงโมจากนครพนมมาขาย เปิดตลาดขายเองหน้าสวน ขายแบบไม่ทัน ประกอบกับต้องเดินทางไปรับสินค้าในระยะไกลพอสมควร จึงมีแนวคิดจะปลูกแตงโมขายเอง เริ่มศึกษาข้อมูลการปลูกแตงโม โดยเฉพาะแตงโมไร้เมล็ดพันธุ์ญี่ปุ่นพมิลีของ บริษัท ชินเจนา ซีด์ส์ จำกัด ที่ได้ราคาสูงและขายดีกว่าพันธุ์อื่น จึงตัดสินใจลงมือปลูก แต่ด้วยพื้นที่ในฟาร์มเหลือน้อย ไม่สามารถปลูกแตงโมลงดินได้เหมือนคนอื่น จึงใช้วิธีปลูกในกระถาง เพราะเมล่อนปลูกในกระถางได้ ทำไม่แตงโมจะปลูกไม่ได้”

ภาคพล ชวีวัฒน์ เจ้าของเกษตรแก้วฟาร์ม อธิบายว่า การปลูกแตงโมในกระถางจะไม่เหมือนปลูกลงดินกลางแจ้ง ที่แตงโม 1 ต้นสามารถเก็บลูกได้ 2 ลูก ปลูกในกระถางสามารถไว้ลูกได้เพียง 1 ลูก เพราะไว้มากกว่า 1 ลูก จะได้แตงโมผลเล็กไม่ได้ขนาด 4-6 กก./ขีน ไปตามที่ตลาดต้องการ



วิธีการปลูก ใช้กระถางขนาด 13-15 นิ้ว เตรียมดินร่วนปนทรายและปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรสำเร็จรูปที่มีขายตามห้องตลาดมารองกัน เพาะกล้าในถาดเพาะ 15 วัน เลือกต้นที่แข็งแรงลงปลูกในกระถางได้ แต่การเพาะกล้าและการปลูก ต้องเพาะและปลูกทั้งแตงโมไร้เมล็ดควบคู่กับแตงโมพันธุ์ทั่วไป ในอัตราแตงโมไร้

เมล็ด 4 ตันต่อແຕງໂມພັນຊູ້ທີ່ໄປ 1 ตัน ້ໍອງຈາກແຕງໂມໄຣເມລິດເກສຣຕັ້ງຜູ້ຈະເປັນໜັນ ຕ້ອງພຶກພາເກສຣຈາກແຕງໂມພັນຊູ້ອື່ນມາຊ່ວຍຜສມພັນຊູ້ໃຫ້ຕິດລູກ

ເມື່ອລົງປຸລູກໃນກະຄາງແລ້ວໃຫ້ຮັດນໍ້າວັນລະຄັ້ງ ພົບເດີນຮະບນນໍ້າຫຍັດ ອຳເນົາໃຫ້ນໍ້າຊຸມເກີນໄປ ທາກດິນຍັງຊຸມ ໄມຕ້ອງຮັດນໍ້າ ທາກພບແມລົງຮບກວນໃຫ້ເນົາໜັກຢູ່ຄາລີປັດສຜສມສະເດາ ພົບອໍານໍາສັນຄວັນໄມ້ ຈຶດພ່ານທຸກ 3-5 ວັນ ໃນຊ່ວງ 10 ວັນ ລັງຍ້າຍັງກະຄາງ ໃຫ້ປຸ່ຢູ່ສູ່ຕຣ 15-15-15...ຮະຍະ 20 ວັນ ຕັນແຕງໂມຈະເຮີມແຕກແຂ່ງ ຕັດແຕ່ງໃຫ້ເລື້ອ 3-4 ແຂ່ງ ໃຫ້ປຸ່ຢູ່ສູ່ຕຣ 15-15-15 ອົກຄັ້ງ ເມື່ອຄຣບ 30 ວັນ ຈະຄື່ງຮະຍະອອກດອກ ນໍາເກສຣຕັ້ງຜູ້ທີ່ບານ (ໄມ້ມີກະເປາະ) ຂອງແຕງໂມພັນຊູ້ອື່ນ 2 ດອກຜສມກັບເກສຣຕັ້ງເມີຍຂອງແຕງໂມໄຣເມລິດ (ມີກະເປາະ) 1 ດອກພຣ້ອມເປັນປຸ່ຢູ່ເປັນສູ່ຕຣ 12-24-12

ຜ່ານໄປ 3 ວັນ ຈະເຮີມເຫັນຜລແຕງໂມ ໃຫ້ເດີດຜລທີ່ຂຶ້ນຕໍ່ກວ່າຂຶ້ອທີ່ 15 ທຶ່ງ ແລ້ວຜລທີ່ສົມບູຮຣົນທີ່ສຸດໄວ້ເພີ່ງ 1 ຜລ ເມື່ອຜລໂຕໄດ້ຮະຍະໜຶ່ງເປັນປຸ່ຢູ່ສູ່ຕຣປຸ່ຢູ່ມາເປັນ 13-13-21 ພຣ້ອມກັບທຳຕາຂ່າຍເສຣົມແຂວນພູ່ງໄມ້ໃຫ້ຜລແຕງໂມຫລັນ ລັງຈາກຜສມເກສຣ 25 ວັນ ຈະໄດ້ຮະຍະເວລາເກີບເກີຍ ທັງນີ້ ຄວາງດໃຫ້ນໍ້າ 7 ວັນ ກ່ອນເກີບຜລຜລິຕເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫວານ