

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : อนุรักษ์วังน้ำค้าง



สภาพอากาศในระยะนี้ลมแรง ตอนเช้าอากาศเย็นมีหมอกและน้ำค้าง ความชื้นในอากาศสูง ตอนกลางวันอากาศร้อน เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรควรพ่นยาป้องกันให้ทั่วถึงเกษตรกรควรระวังโรคโคนเน่า เป็นโรคสำคัญที่สุดสำหรับการปลูกองุ่นในบ้านเรา หากเกิดการระบาดของ

รุนแรงสามารถสร้างความเสียหายให้กับองุ่นได้มาก

อาการที่ใบ เนื้อเยื่อบนใบจะเกิดแผลสีเหลืองอ่อน หากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ที่บริเวณใต้ใบด้านตรงข้ามแผลจะพบเชื้อราสีขาวยื่นฟู ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ถ้าระบาดรุนแรง ก้านใบจะมีแผลซ้ำ ใบจะเหลือง แห้ง และหลุดร่วง

อาการที่ยอด เถาอ่อน และมือเกาะ มักพบเชื้อราสีขาวยื่นฟูเป็นกลุ่มปกคลุม ยอดหดสั้น เถาและมือเกาะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้ง

อาการที่ช่อดอกและผลอ่อน จะพบเชื้อราสีขาวยื่นฟูปกคลุมช่อดอกและผลอ่อน ทำให้ดอกร่วง ช่อดอกเน่า และผลอ่อนร่วง

หากพบโรคเริ่มระบาดให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคและให้นำออกจากแปลงไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อราก่อโรค จากนั้นให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ+ เมทาแลกซิล-เอ็ม 64%+4% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไอโพรวาโลคาร์บ+โพรพิเนบ 5.5%+61.3% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน และไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจน (N) สูงเกินไป เพราะจะทำให้พืชอ่อนแอต่อการเกิดโรค

สละ-เล-เต